

Bekämpfungshinweise für den Profi

In Landwirtschaft und Gartenbau, an National- und Kantonsstrassen Herbizide nur in Kombination mit anderen Massnahmen anwenden.

Herbizide (Wuchsstoffe oder Kontaktherbizide) wirken im Jugendstadium der Ambrosia sehr gut. Nach einem ersten Schnitt treibt Ambrosia wieder aus. Zweiter Schnitt erreicht tiefliegende Austriebe nicht, deshalb Austriebe mit Herbizid behandeln.

Einzelpflanzen auf Wegen und Plätzen, an Strassen und in Gärten nicht mit Herbiziden bekämpfen.

Verwechslungsmöglichkeiten:

Weisser Gänsefuss *Chenopodium album*

Blätter mit Mehlstaub belegt, vielgestaltig, oval, lanzettlich

Amarant *Amaranthus retroflexus*

Blätter rhombisch oder eiförmig, wellig mit aufgesetzter Spitze

Gemeiner Beifuss *Artemisia vulgaris*

Blätter 1-2 fach fiederschnittig; oberseits grün, unterseits weissfilzig

Internetadressen:

www.acw.admin.ch (dossier spécial Ambrosia)

www.ambrosia-info.ch

www.ambroisie.info

www.apug.ch

www.cps-skew.ch

www.meteoschweiz.ch

www.polleninfo.ch

www.umwelt-schweiz.ch

www.nationalstrassen.ch



Abgeschnitten oder abgerissen sowie nach Herbizideinsatz kann Ambrosia wieder austreiben.

Achtung



Blühende Ambrosia nur mit Feinstaubmaske und Handschuhen ausreissen.

Ambrosia Bedrohung für Gesundheit und Biodiversität



April 2006

Faltblätter bestellen bei:

Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Christian Bohren
Postfach 1012
1260 Nyon 1

www.acw.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Forschungsanstalt
Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Meteo Schweiz

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA

Gefahr für die Gesundheit

Die Ausbreitung der Ambrosia stellt ein ernst zu nehmen-
des gesundheitliches Risiko dar.
Ambrosiapollen verursachen Allergien: tiefende, juckende
Nase, tränende, geschwollene Augen, Entzündung der
Bronchialschleimhaut und in schweren Fällen Asthma.
Zwischen 10 und 15 % der Bevölkerung können
pollenallergisch reagieren, 25 % der Ambrosia-Allergiker
werden zusätzlich unter Asthmaanfällen leiden.

Wirtschaftliche Konsequenzen

Gemäss einer Schätzung können jährliche Kosten für
Medikamente und Arzt pro Patient von CHF 100.-
(Allergiker) und von CHF 1000.- (Asthmatiker) entstehen.
Dies würde jährliche Gesamtkosten in der Schweiz von
ca. CHF 325 Mio. ergeben. Dieser Betrag entspricht den
Erfahrungen im Ausland.

Gemeinsame Aktion

Die Schweiz erlebt zur Zeit eine Phase der Einschleppung
von Ambrosia. Mit einem kostengünstigem Engagement
von Behörden, Spezialistinnen und Spezialisten sowie
Privatpersonen kann eine wirksame Bekämpfung dieses
einjährigen Unkrauts erreicht werden.

Was tun?

- 1 bis etwa 20 Pflanzen gefunden:
ausreissen und mit Hauskehricht entsorgen.
Im nächsten Jahr Standort kontrollieren.

Pflanzen nicht kompostieren.

- Mehr als 20 Pflanzen gesehen:
sofort Gemeindeverwaltung informieren.
Standort überwachen, er könnte mehrjährig sein.

**In jedem Fall Standort an Gemeindeverwaltung
melden.**

Ambrosia artemisiifolia L.

Die Beifussblättrige Ambrosie (oder Aufrechtes Trauben-
kraut) – ursprünglich aus Nordamerika eingeschleppt
– ist eine einjährige Pflanze, deren Wuchshöhe stark von
Bodenart, Licht, Feuchtigkeit, etc. abhängt und etwa 30
cm bis 1,5 m hoch wachsen kann. Ihre Blätter sind doppelt
fiederteilig, gestielt und beide Seiten sattgrün mit weisslicher
Nervatur. Der meist rötliche Stängel ist behaart, robust und
stark
verzweigt. Die Pflanze ist einhäusig, männliche und
weibliche Blüten sind getrennt. Es kann vorkommen, dass
Ambrosia nur weibliche Blüten bildet. Auf nährstoffarmen
Böden bleibt Ambrosia klein und bildet wenig Samen; auf
nährstoffreichen Böden wird sie gross und produziert viele
Pollen und Samen.

**Ambrosia vermehrt sich nur über ihre Samen.
Ambrosiapflanzen überleben den Frost nicht.**

Pollen

ca. 76 Mio. -1 Mia. Pollen / Pflanze;
fliegen z.T. > 200 km.



Samen (2-4 mm)

ca. 30 - 3000 Nüsschen / Pflanze;
ca. 40 Jahre keimfähig;
fliegen nicht.



Keimling

Keimung ab April; Ambrosia kann
sich invasionsartig ausbreiten.



**Ziel: möglichst alle Pflanzen vor der Blüten- und
Samenbildung vernichten, um die Ausbreitung von
Ambrosia zu verhindern.**



Vegetationsperiode:

April



Mai



Juni

Juli



August



September



Oktober



November

Ambrosia vor d

Achtung Pollenflug

Reife Samen fallen leicht aus der Blüte

Gefährdete Biodiversität

Ambrosia ist eine ruderale Pflanz-
enart. Sie besiedelt sichtbaren
Boden (Erde, Sand, Kies) und kann
wegen ihres flächendeckenden Aus-
breitungspotentials die einheimische
Flora verdrängen und damit die
Biodiversität gefährden.

männliche Blüte
Pollenspender



Wie verbreitet sie sich?

Vogel- und Kleintierfutter
Erdrtransporte
Bau- und Landmaschinen
Schmutz an Fahrzeugen



Wo ist sie zu finden?

In Privatgärten und Parkanlagen,
entlang von Strassen und Bahnen,
auf Kompostplätzen und
Ruderalstellen, in Kiesgruben,
auf Baustellen und in
landwirtschaftliche Kulturen.

weibliche Blüte
Samenträger

